



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITĂRĂ

TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com



Nr. 13 din 15.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile și fenofaza culturii, au determinat apariția daunătorilor în **culturile de rapita** (gandacul lucios, purici, viespea rapitei, etc)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, folosind unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- *Mavrik 2F – 0,2 l/ha;
- *Biscaya 240 OD – 0,3l/ha;
- Kaiso Sorbie 5EG – 0,15 l/ha;
- Nurelle D 50/500 – 0,4 l/ha.
- Lamdex 5EC – 0,15 l/ha;
- **Decis Mega 50 EW – 0,15l/ha;

Tratamentul se va executa în perioada de formare a butonilor florali până, la începutul înfloritului. După înflorit tratamentele nu mai au aceeași eficiență.

*** se poate aplica și în timpul înfloritului cu anunțarea prealabilă a crescătorilor de albine;**

****nu se aplica în timpul înfloritului;**

Unde se constată atac de boli (Phoma, Sclerotinia, Botrytis, Erisiphe, Alternaria) se adaugă unul din fungicidele recomandate mai jos:

- Mystic Pro – 1,25l/ha
- Pictor – 0,5l/ha
- Tilmor 240 EC – 1l/ha
- Acanto Plus – 0,6l/ha

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de “înflorire” pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit

Ing. Serban V.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE


DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DĂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITARA

TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com



Nr.10 din 14.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: monilioza, antracnoza, ciuruire, patare roșie, afide, insecte defoliatoare, care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

SIMBUROASE

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- fenofaza buton alb – început înflorit;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- Merpan 80 WDG – 0,15% + Fastac 10 EC – 0,01%

- Bravo 500 SC – 0,15% + Karate Zeon – 0,015%;

Tratamentul se va aplica în fenofaza de buton alb – început înflorit.

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.

Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictețe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

Intocmit,
ing. Serban V.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITARA

TARGOVISTE, STR. I.C. BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX: 0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 11 din 14.04.2015



BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: rapan tr. II, monilioza, pureci meliferi, alți daunători care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

PAR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- *tratament de siguranță înainte de înflorit;*

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- Chorus 50WG – 0,03% + Movento – 0,1875%;
- Dithane M45 – 0,2% + Vertimec 1,8% EC – 0,1%;
- Merpan 80 WDG – 0,15% + Nurelle D 50/500 EC – 0,075%;

Tratamentul se va aplica în fenofaza de înfiorarea corolei – primele flori deschise.

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.

Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictete frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de "înflorire" pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit
ing. Serban V.